

# Vacetto RZ

## teelthandleiding



### Raseigenschappen

- **Segment: geblokte tomaat.**
- **HR ToMV:0-2/Fol:0 IR Sbl.**
- **Gem. vruchtgewicht: 20 g.**
- **(trostomaat en losse oogst mogelijk).**
- **Trossen met circa 12 -14 vruchten per tros.**
- **Vlakke trossen.**
- **Mooi donkerrode geblokte vruchten.**
- **Zeer weinig gevoelig voor scheuren.**
- **Sterke groene delen.**
- **Smakelijke tomaat met een brix van circa 9.**
- **Goede houdbaarheid en shelflife.**
- **Sterk generatief gewas.**
- **Overzichtelijk, voldoende open groeiwijze.**

### Tips voor de plantenkweker

Het is aan te raden Vacetto RZ te enten op een krachtige, generatieve onderstam, zoals Emperador RZ, Bruce RZ of Kaiser RZ.

### Tips voor de teler

#### Algemeen

Vacetto heeft wat gerekter en open gewasstype. De groeikracht is meer dan men zou verwachten bij dergelijk open gewasstype. Vacetto zal niet snel zwaar en/of vegetatief groeien. De bloemen van het ras zetten vrij gemakkelijk zonder extreme sturingen..

## Vacetto RZ teelthandleiding

### Beheersfase

Wij adviseren de mat vol te druppelen met een EC van minstens 3,5 mS/cm. Als schema kan een normaal voldruppel/startschema aangehouden worden..

### Op de mat

Vacetto kan gewoon bij de eerste tros volledige bloei de mat op. De eerste trossen zetten over het algemeen vrij gemakkelijk. Zijn de planten getopt op het 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> blad, zet dan bij het op de mat gaan de scheuten op hetzelfde oksel in dezelfde richting. Dit bevordert gelijkheid.

### Teeltsysteem

Voor het behalen van een voldoende hoge productie is een hoge stengeldichtheid noodzakelijk. Afhankelijk van het kastype is in de zomer een stengelafstand tussen 3,8 en 4,2 stengels/m<sup>2</sup> gewenst.

Richtlijn: houd bij een 10 procent minder lichte kas, 10 procent minder stengeldichtheid aan. Neem hierin ook mee hoeveel CO<sub>2</sub> u kunt doseren.

De stengeldichtheid mag niet leiden tot een vol gewas. Bij volle gewassen zien we minder bloemen per tros en meer plantverschillen.

### Grofheid

Streef ernaar dat het gemiddeld vruchtgewicht zo snel mogelijk op peil is (bij trostomaten 20 gram of meer). Door vanaf het begin generatief te telen. Dat wil zeggen een dag-/nachtverschil van bijvoorbeeld 5 graden. Extreem lage etmalen, zoals bij cherry-tomaten, zijn niet aan te raden. Vacetto geeft niet bijzonder veel splitstrossen, waardoor de trosaanmaak c.q. bloeisnelheid belangrijk zijn voor het behalen van de optimale productie. Bij teelt als losse tomaat zal het vruchtgewicht lager zijn doordat de trossen niet worden teruggesnoeid.

Trosbehandeling is bij oogsten als trostomaat noodzakelijk om een snelle/gelijkmatige afrijping binnen de tros te bevorderen.

De vruchten binnen een tros hebben een vrij uniforme vorm, maat en gewicht. Door het open gewastype is blad uit de kop halen normaliter niet nodig. Streef vanaf half april naar circa 15 bladeren per stengel gerekend vanaf

de bloeiende tros. Bij heel dichte stengelafstanden kan dit enkele bladeren minder zijn.

### Streefwaarden

Lengtegroei circa 30 cm/week.

Kopdikte 9,0-10,0 millimeter.

Bloeisnelheid 1 tros per week.

Zetting, (gesnoeid en geoogst als trostomaat) tussen week 14 en 26: circa 50-60 vruchten/m<sup>2</sup>/week.

### Trossnoei

De grootte van de tros is afhankelijk van de kracht van de plant en een generatievere of meer vegetatieve sturing. Het aantal bloemen per tros is te beïnvloeden met behulp van onder andere etmaaltemperatuur. Bij lagere voornachten en vrij lage etmaaltemperaturen zijn in de eerste fase van de teelt bijvoorbeeld trossen van wel 16 tot soms wel 22 bloemen per enkele tak te realiseren. Bij oogst als trostomaat is het afhankelijk van de fase van de teelt, mogelijk om trossen van gemiddeld 12 tot 14 vruchten per tak te oogsten. Het is daarom het beste om bij oogst als trostomaat niet te extreem koel te telen. De trossen zullen dan nauwelijks splitsen en wat korter worden waarbij het wegnemen van bijvoorbeeld circa 2 à 3 puntbloempjes volstaat.



## Vacetto RZ teelthandleiding

### Watergift en voeding

Houdt het gehele jaar een EC gift aan van 3 met een terugloop naar 2.8 bij een maximale lichtintensiteit. In de registratie dient men of de gemiddelde EC gift per week te noteren, of de standaard EC gift met de eventuele lichtverlaging.

Vacetto verbruikt in het vroege voorjaar circa 10 procent minder water dan bijvoorbeeld cocktailtomaat Briosio RZ. Dit komt door het openere gewastype. Als er later in het voorjaar meer stengels en eventueel ook wat meer bladeren zijn aangehouden is het waterverbruik niet afwijkend van andere rassen.

Het ras is sterk tegen gescheurde vruchten. In een scheurgevoelige periode is het geven van een druppelbeurt in de nanacht desondanks gewenst.

Het is gewenst om de voeding in de mat wekelijks te meten om tijdig sturing te geven om de smaak te waarborgen.

### Temperatuurstrategie

Zorg voor voldoende etmaaltemperatuur bij oogst als trostomaat.

Het dag/nachtverschil (de gemiddelde nacht) minimaal 5 graden.

Extreme middagverhogingen zijn niet nodig en kunnen het gewas zelfs schraal maken

Ook bij minder lichte omstandigheden zien we over het algemeen voldoende doorgroei.

Lichtafhankelijk stoken is desondanks aan te raden.

Een middagverhoging.

Altijd een flinke voornachtverlaging.

Het instellen van de nanacht zal men lichtafhankelijk moeten regelen.

Een lichtverhoging van 2 graden, later in de teelt kan deze middagverhoging minder zijn.



Beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en elke andere informatie in welke vorm dan ook van Rijk Zwaan, bijvoorbeeld over de houdbaarheidsdatum, zaai-, plant- en oogstdata, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Rijk Zwaan aanvaardt echter in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van zulke beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en informatie. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste opslag van de zaden en dient zelf te beoordelen of de zaken en teeltadviezen geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt. Voor meer informatie over de resistentie statement, verwijzen wij u naar de website [www.rijkszwaan.nl](http://www.rijkszwaan.nl). Opname van een ras in deze uitgave betekent niet automatisch dat dit ras beschikbaar is voor exploitatie; het kan alleen voor beproeving beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijk Zwaan ([www.rijkszwaan.nl](http://www.rijkszwaan.nl)). De foto's in deze uitgave demonstreren de types waartoe de genoemde rassen behoren en niet alle rassen als zodanig. Deze foto's vormen geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, t.a.v. de