


# Longo RZ

## Teelthandleiding



Veruit het grootste areaal aubergine in Nederland bestaat uit de ovale types, maar daarnaast worden er op een aantal hectares andere types aubergine geteeld. Daarvan maakt het lange ofwel Turkse type op dit moment het grootste deel uit. Eén van deze auberginerassen is Longo RZ. Longo valt op door zijn mooie donkere kleur en zijn lange en smalle vruchtvorm. Wat kenmerkt het ras nog meer? En hoe is Longo het beste te telen?

In vergelijking met een gewone, ovale aubergine is Longo - de naam zegt het al - langer en smaller en heeft het ras meer smaak. Een ander sterk punt van Longo is dat er weinig zaden in de vrucht zitten, wat afnemers erg waarderen. Het vruchtgewicht van deze aubergine is 230 tot 250 gram. Telers van deze Turkse aubergine telen Longo daarnaast vanwege de uitstekende vruchtkwaliteit, de lange houdbaarheid en de mooie vruchtvorm.

Het areaal Longo wisselt nogal per jaar want de telers zijn meestal gelegenheidstelers met grondteelten op huurtuinen. Jaarlijks wordt er zo'n 10 hectare Turkse aubergine geteeld. Op substraat is Longo ook goed te telen maar het ras is wel erg groeizaam. De productie per m<sup>2</sup> ligt beduidend lager dan die van een teelt met de standaard

ovale aubergine. De meerwaarde van dit product moet dan ook gezocht worden in de hogere prijs per kilo en het feit dat het sorteren tijdens het oogsten kan. Hierbij wordt een enkele afwijkende vrucht apart gehouden en het product in kratten uiteindelijk nog nagewogen in de schuur.


Hieronder volgt een beknopte teeltbeschrijving voor een grondteelt.

### Teelt

Voor de teelt onder glas in de grond wordt Longo vanaf ongeveer 10 april geplant. Bij de plantenkweker wordt dan half februari gezaaid. Soms wordt er een geënte plant gebruikt omdat een aubergine nogal gevoelig is voor het bodemziektes zoals het

wortelknobbelaaltje. Direct na het planten wordt aangegoten met de slang om te zorgen voor een goede aansluiting met de grond. Met het starten in de kas, moeten de planten de eerste twee weken op weg geholpen worden met een dag- en nachttemperatuur van 18/19°C. De teler kan hierna water geven om klimaat te maken. De watergift is natuurlijk afhankelijk van de grondsoort en het type kas. Geënte planten hebben minder water nodig, omdat de wortels groeikrachtiger zijn en zelf hun weg zoeken. Na het aanslaan kan de nachttemperatuur zakken naar 15°C en kan afluchten overdag vanaf 18°C. Gedurende het verloop van de teelt dient veel te worden gelucht om schimmelziektes als Botrytis te voorkomen. Water geven doet men nu onderdoor met een gietdarm of druppelaars.

## Longo RZ teelthandleiding



### Plantafstand

De plantafstand van Longo is 1,2 tot 1,5 planten per m<sup>2</sup>. Per plant worden in het begin van de teelt zo'n 4 stengels aangehouden, wat neerkomt op 5 tot 6 stengels per m<sup>2</sup>. Hierbij wordt voor het aanbinden een V-systeem aangehouden, zodat het gewas meer open staat. Het is niet noodzakelijk om de stengels/scheuten die er in de loop van de teelt bijgroeien te verwijderen

of aan te binden. Deze aubergineteelt wordt meestal doorgetrokken tot begin oktober want daarna wordt de productie veel minder en heeft het gewas de maximale lengte bereikt. Ook is er dan nog voldoende tijd voor een vervolgteelt van bijvoorbeeld andijvie of kassla.



Beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en elke andere informatie in welke vorm dan ook van Rijk Zwaan, bijvoorbeeld over de houdbaarheidsdatum, zaai-, plant- en oogstdata, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Rijk Zwaan aanvaardt echter in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van zulke beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en informatie. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste opslag van de zaden en dient zelf te beoordelen of de zaken en teeltadviezen geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.

Opname van een ras in deze uitgave betekent niet automatisch dat dit ras beschikbaar is voor exploitatie; het kan alleen voor beproeving beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijk Zwaan ([www.rijkszwaan.nl](http://www.rijkszwaan.nl)).

De foto's in deze uitgave demonstreren de types waartoe de genoemde rassen behoren en niet alle rassen als zodanig. Deze foto's vormen geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, t.a.v. de prestaties van het gewas.